

La Paralyse Cérébrale, c'est quoi?

Vous pouvez nous aider à faire avancer la recherche sur la paralysie cérébrale. Vous trouverez plus d'information sur le site worldcpday.org/cpregisters


La paralysie cérébrale est un ensemble de troubles permanents du développement du mouvement et de la posture, responsables d'une déficience motrice.

C'est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant.

17 millions de personnes dans le monde atteintes de paralysie cérébrale

L'ATTEINTE MOTRICE : DIFFERENTS TYPES

SPASTIQUE: 70-80%. La forme la plus courante. Muscles raides et tendus. Provient d'une atteinte du Cortex moteur.



DYSKINETIQUE: 6%. Caractérisé par des mouvements involontaires. Provient d'une atteinte à la base des ganglions.

TYPES MIXTES: Combinaison des atteintes.

ATAXIQUE: 6%


Caractérisé par des mouvements instables. Affecte l'équilibre et le sens des repères dans l'espace. Provient d'une atteinte du cervelet.

PARTIES DU CORPS

La paralysie cérébrale peut atteindre différentes parties du corps.

QUADRAPLEGIE/ BILATERALE:


MEMBRES TOUCHÉS
1 2 3 4



Les deux bras et deux jambes sont touchés. Les muscles du tronc, le visage et la bouche sont aussi souvent affectés.

DIPLEGIE/ BILATERALE:


MEMBRES TOUCHÉS
1 2 3 4



Les deux jambes sont touchées. Les bras peuvent être affectés dans une moindre mesure.

HEMIPLÉGIE/ UNILATERALE:


MEMBRES TOUCHÉS
1 2 3 4



Un seul côté du corps (jambe + bras) est touché.


MOTRICITE GLOBALE

La motricité globale (par exemple s'asseoir et marcher) des enfants et des jeunes atteints de paralysie cérébrale peut être classée en 5 niveaux différents à l'aide d'un outil appelé le Système Classification des Fonctions Motrices Globales (GMFCS) développé par CanChild au Canada.



HABILETE MANUELLE

Au moins deux tiers des enfants atteints de paralysie cérébrale auront des difficultés de mouvement affectant un ou deux bras. La majorité des activités quotidiennes est impactée.



DEFICIENCES ASSOCIEES

Les enfants atteints de paralysie cérébrale peuvent également avoir d'autres déficiences physiques et cognitives.

1 sur 3

ne peut pas marcher



1 sur 4

ne peut pas parler



3 sur 4

sont sujets aux douleurs




1 sur 4

est épileptique



1 sur 4

a des troubles du comportement



1 sur 2

a une déficience intellectuelle



1 sur 10

a une déficience visuelle grave



1 sur 4

souffre d'incontinence




1 sur 5

a des troubles de sommeil



1 sur 5

a des problèmes de contrôle de la salive



Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale
worldcpday.org

Avec le soutien de The Allergan Foundation

References: Novak I, Hines M, Goldsmith S, Barclay R (2012). Clinical prognostic messages from a systematic review on cerebral palsy. *Pediatrics*. Nov 2012;130 (5). Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E & Galuppi B (1997). Development and validation of a Gross Motor Function Classification System for children with Cerebral Palsy. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 39, 214-223. CanChild Centre for Childhood Disability Research www.canchild.ca. Australian Cerebral Palsy Register Report 2013 www.cpregister.com.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PARALYSIE CÉRÉBRALE
05.OCT.2016